


# CÁNCER DE SENO LOBULILLAR INVASIVO SEPA DÓNDE SE METASTATIZA

El cáncer de seno lobulillar invasivo se puede metastatizar (expandir) tanto a partes habituales del cuerpo, como el hígado, los pulmones o los huesos, como a otras poco frecuentes, como el tubo digestivo y los ovarios. Este cáncer se puede metastatizar muchos años después del tratamiento inicial.





## COMUNIQUE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS (LOS QUE SON DISTINTO A DOLORES USUALES) A SU MÉDICO

- Dolor en los huesos que no desaparece, especialmente en la espalda, las caderas, las costillas o los muslos sin causa aparente
- Sangrado pélvico inusual
- Dolor abdominal, dificultad para comer o distensión y/o hinchazón abdominal
- Pérdida de peso sin causa aparente
- Dificultad o dolor al respirar sin causa aparente
- Dolores de cabeza frecuentes, mareo, función intelectual mermada
- Hinchazón o bultos en el pecho, las axilas, el cuello o las ingles
- Cambios en el color de la piel, sarpullido persistente o nódulo firme
- Dificultad nueva con su visión



**Puntos del cuerpo donde se metastatiza el cáncer de seno lobulillar invasivo**

## APRENDE SOBRE EL CÁNCER DE SENO LOBULILLAR INVASIVO:

-  @LobularBCA
-  Lobularbreastcanceralliance
-  Lobular Breast Cancer Alliance
-  Lobular Breast Cancer Alliance

 [lobularbreastcancer.org](http://lobularbreastcancer.org)

