


កោសិកដំសាថ់នៃផែមហារីកសុដន្តក្រពេទ្យទឹកដោះភាពគ្នា (ILC)


- >95% ផ្លូវការអើន E-Cadherin ដែលអាចឱ្យមានការគេរបៀប
- កោសិកាលូតលាស់នៅក្នុងម្រោងនកសារតែម្មយ



ផ្លូវការ


កោសិកដំសាថ់នៃផែមហារីកសុដន្តបំពានទឹកដោះភាពគ្នា (IDC)

- ប្រើការអើន E-Cadherin ដើរក្នាតទឹកដោះភាពគ្នា “ការកោសិកា”
- ដំសាថ់ដុំជាបង្ហាមទៅបុងចំឡើង




កោសិកដែលមានសុខភាពល្អ ផ្លូវការ កោសិកមហារីក

- កោសិកាភាមួល បុរាណពង្រកពី
- ស្មួលកោសិកាទោល រាងស្រី
- ស្មួលកោសិកាប្រាស់ក្នុងទោល
- បរិមាណអង្គធតករី cytoplasmic ប្រើប្រាស់ →
- ការលួយតាមសំណងអាចត្រូវបែងចាន
- មិនវិភាគលិខិតនៅក្នុងផែមហារីក



- រូបរាង និងទំហំកោសិកាមិនពេញទាត់
- ស្មួលកោសិកាលីក
- ស្មួលកោសិកាប្រើនិន
- បរិមាណអង្គធតករី cytoplasmic គិតចងក
- ការលួយតាមសំណងមិនអាចត្រូវបែងចាន
- អាចផ្តល់ទៅក្នុងផែមហារីកដោយ (ការបែងចាន)



ស្មួលកោសិកា: មម្វេមឈូលក្រពិនិត្យនៃកោសិកដែលមាន DNA និង RNA

កោសិកាប្រាស់ក្នុងទោល: អ្នកឱ្យដោយ RNA និងប្រើការអេសបេដីកទៅផ្តើរក្រុងបន្ទីកម្មសម្រាក់លក់

អង្គធតករី Cytoplasm: អង្គធតករីមានលក្ខណៈស្ថិចចាបូយ៉ែលបំពេញដូចការអង្គធតករីនៃកោសិកា