


سرطان الثدي الفصيبي النقيلي (ILC) اعرف حول مواقع الأورام



مواقع السرطان الفصيبي الغازي (ILC)

يمكن أن يزيد السرطان الفصيبي الغازي (ينتشر) في مواقع شائعة مثل الكبد، والرئة، والعظام بالإضافة إلى مواقع أقل شيوعاً، مثل قنوات الجهاز الهضمي والمبايض. يمكن أن يظهر السرطان الفصيبي الغازي (ILC) بعد العلاج الأولي.

الأعراض (أكثر من الآلام والأوجاع العادية) التي تبلغ عنها الطبيب

- آلام العظام غير المبررة التي لا تزول، وخاصة في الظهر، أو الأوراك، أو الضلوع، أو الأضلاع
- نزيف الحوض غير الطبيعي
- آلام المعدة، وصعوبة الأكل أو انتفاخ البطن و/أو الانتفاخات
- فقدان الوزن غير المبرر
- قصر النفس غير المبرر، أو النفس المؤلم، أو السعال
- الصداع المتكرر، والدوار، وعجز في الوظائف الإدراكية
- التهاب أو تكتلات في الصدر، أو الإبط، أو الرقبة، أو الأربية
- التغيرات في لون البشرة، والحكة المستمرة أو العقيدة (العقيدات) المتصلبة
- صعوبات جديدة في الرؤية

معرفة المزيد حول سرطان الثدي الفصيبي النقيلي:



LobularBCA@



Lobularbreastcanceralliance



اتحاد مرضى سرطان الثدي الفصيبي



اتحاد مرضى سرطان الثدي الفصيبي



lobularbreastcancer.org

