


# INVASIVER LOBULÄRER BRUSTKREBS (ILC) WO ENTSTEHEN METASTASEN

**ILC-Metastasen (Tochtergeschwülste) bilden sich (streuen) häufig an Stellen wie Leber, Lunge und Knochen, aber auch an weniger häufigen Stellen wie dem Magen-Darm-Trakt und den Eierstöcken. Nach der ersten Behandlung kann ILC viele Jahre Metastasen bilden.**


## **SYMPTOME (AUSSER DEN BEKANNTEN BESCHWERDEN UND SCHMERZEN), ÜBER DIE SIE IHRE ÄRZTIN ODER IHREN ARZT INFORMIEREN SOLLTEN**

- Unerklärliche, anhaltende Knochenschmerzen, insbesondere im Rücken, in den Hüften, Rippen oder Oberschenkeln
- Ungewöhnliche Beckenblutungen
- Bauchschmerzen, Beschwerden beim Essen und/oder Blähungen
- Unerklärlicher Gewichtsverlust
- Unerklärliche Kurzatmigkeit, Schmerzen beim Atmen oder Husten
- Häufige Kopfschmerzen, Schwindel, gestörtes Denkvermögen
- Schwellungen und Klumpen in Brust, Achselhöhle, Hals oder Leiste
- Veränderungen der Hautfarbe, anhaltender Ausschlag oder feste Knoten
- Neu aufgetretene Beschwerden beim Sehen




## **ERFAHREN SIE MEHR ÜBER DIE LOBULAR BREAST CANCER ALLIANCE:**

 @LobularBCA

 Lobularbreastcanceralliance

 Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Lobular Breast Cancer Alliance

 Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Lobular Breast Cancer Alliance

 [lobularbreastcancer.org](http://lobularbreastcancer.org)

**LBCA**® | Lobular Breast Cancer Alliance