


ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΛΟΒΙΑΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (ILC) ΜΑΘΕΤΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το διηθητικό λοβιακό καρκίνωμα μπορεί να κάνει μετάσταση (εξάπλωση) σε κοινές θέσεις, όπως το ήπαρ, οι πνεύμονες και τα οστά, καθώς και σε λιγότερο κοινές θέσεις, όπως ο γαστρεντερικός σωλήνας και οι ωθήκες. Το διηθητικό λοβιακό καρκίνωμα μπορεί να κάνει μετάσταση πολλά χρόνια μετά την αρχική θεραπεία.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ (ΠΕΡΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΓΗ) ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΣΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ

- Ανεξήγητος πόνος στα οστά που δεν υποχωρεί, ειδικά στην πλάτη, τους γοφούς, τα πλευρά ή τους μηρούς
- Ασυνήθιστη πυελική αιμορραγία
- Κοιλιακό άλγος, δυσκολία στο φαγητό ή κοιλιακή διάταση ή/και φούσκωμα
- Ανεξήγητη απώλεια βάρους
- Ανεξήγητη δύσπνοια, επώδυνη αναπνοή ή βήχας
- Συχνοί πονοκέφαλοι, ζάλη, μειωμένη πνευματική λειτουργία
- Οίδημα ή εξογκώματα στο στήθος, τη μασχάλη, τον λαιμό ή τη βουβωνική χώρα
- Αλλαγή στο χρώμα του δέρματος, διαρκές εξάνθημα ή σταθερός(οί) όζος(οι)
- Νέα δυσκολία στην όρασή σας




ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΒΙΑΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ:

 @LobularBCA

 Lobularbreastcanceralliance

 Lobular Breast Cancer Alliance

 Lobular Breast Cancer Alliance

 lobularbreastcancer.org

 **LBCA**®
Lobular Breast Cancer Alliance