


इनवेसिव लोब्यूलर स्तन कैंसर (ILC)

उन जगहों के बारे में जानें जहाँ कैंसर फैलता है

जिगर, फेफड़े और हड्डियों जैसी सामान्य जगहों के साथ-साथ जठरांत्र मार्ग और अंडाशय जैसी जगहों पर ILC फैल सकता है, जो सामान्य नहीं हैं। प्रारंभिक उपचार के कई वर्षों के बाद, ILC के शरीर के अन्य भागों में फैलने की संभावना होती है।

ऐसे लक्षण (सामान्य दर्द के अलावा) जिनके बारे में अपने डॉक्टर को बताना चाहिए

- खास तौर पर पीठ, कूल्हों, पसलियों या जाँघों में लंबे समय तक रहने वाला दर्द
- पेल्विक क्षेत्र में असामान्य रक्तस्राव होने पर
- पेट में दर्द, खाने में परेशानी या पेट के फूलने और/या उसमें सूजन होने पर
- बिना किसी स्पष्ट कारण के वजन कम होने पर
- साँस लेने में परेशानी, साँस लेने में दर्द का अनुभव या खाँसी होने पर
- बार-बार सिरदर्द होने, चक्कर आने या सोचने में समस्या होने पर
- छाती, बगल, गर्दन या कूल्हे और जाँघ के बीच के हिस्से में सूजन या गाँठ होने पर
- त्वचा के रंग में बदलाव, स्थायी दाने या सख्त गाँठें होने पर
- दृष्टि में नई समस्या होने पर



लोब्यूलर स्तन कैंसर के बारे में जानें:

@LobularBCA

Lobularbreastcanceralliance

Lobular Breast Cancer Alliance

Lobular Breast Cancer Alliance

lobularbreastcancer.org

Lobular Breast Cancer Alliance