

CARCINOMA LOBULARE INVASIVO DELLA MAMMELLA (ILC) CONOSCERE I SITI METASTATICI

L'ILC può metastatizzare (diffondersi) in siti comuni come fegato, polmoni e ossa, nonché in siti meno comuni, come il tratto gastrointestinale e le ovaie. L'ILC può metastatizzare molti anni dopo il trattamento iniziale.

SINTOMI (OLTRE A MALESSERI E DOLORI SOLITI) DA SEGNALARE AL MEDICO

- Dolore osseo inspiegabile che non scompare, soprattutto alla schiena, ai fianchi, alle costole o alle cosce
- Sanguinamento pelvico insolito
- Dolore addominale, difficoltà a mangiare o nella distensione e/o gonfiore addominale
- Perdita di peso inspiegabile
- Respiro corto inspiegabile, respirazione dolorosa o tosse
- Frequenti mal di testa, vertigini, compromissione della funzionalità cognitiva
- Gonfiore o noduli al petto, all'ascella, al collo o all'inguine
- Cambiamento del colore della pelle, eruzione cutanea duratura o nodulo/i solido/i
- Nuova difficoltà visiva


CONOSCERE IL CARCINOMA LOBULARE DELLA MAMMELLA:

 @LobularBCA

 Lobularbreastcanceralliance

 Lobular Breast Cancer Alliance (LBCA)

 Lobular Breast Cancer Alliance (LBCA)

 lobularbreastcancer.org

 **LBCA**[®] | Lobular Breast Cancer Alliance

