


# ជំងឺមហារីកសុដន់ក្រពេញទឹកដោះរាតត្បាត (ILC) ដឹងពីកន្លែងកំណត់ការរីករាលដាល

**ILC អាចរីករាលដាល (ឆ្លងរាលដាល) ទៅកាន់កន្លែងទូទៅដូចជា ថ្លើម សួត និងឆ្អឹង ក៏ដូចជាទៅកាន់កន្លែងមិនសូវឆ្លងរាលដាល ដូចជាតំបន់ GI និងអូដេ។**  
**ILC អាចរីករាលដាលជាច្រើនឆ្នាំ បន្ទាប់ពីការព្យាបាលដំបូង។**

## រោគសញ្ញា (លើសពីការឈឺ និងការឈឺចាប់ធម្មតា) ដើម្បីរាយការណ៍ទៅវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក

- ការឈឺចាប់នៃឆ្អឹងដែលមិនអាចពន្យល់បាន ដែលមិនទៅវិញ ជាពិសេសនៅលើខ្នង ក្រគាក ឆ្អឹងដំនី ឬក្បាល
- ហូរឈាមក្នុងអាងក្រគាកមិនធម្មតា
- ឈឺចុកចាប់ ពិបាកញ្ជាំ ឬឈឺពោះ និង/ឬហើមពោះ
- ការសម្រកទម្ងន់ដែលមិនអាចពន្យល់បាន
- ដង្ហើមខ្លី ដកដង្ហើមឈឺចាប់ ឬក្អកដែលមិនអាចពន្យល់បាន
- ឈឺក្បាលញឹកញាប់ រិលមុខ មុខងារបញ្ហាខ្សោយ
- ហើម ឬមានដុំពកក្នុងទ្រូង ក្លៀក ក ឬក្រលៀន
- ការផ្លាស់ប្តូរពណ៌ស្បែក កន្ទួលរមាស់យូរ ឬដុំពករឹង
- ភាពលំបាកជាមួយនឹងការមើលឃើញរបស់អ្នក។



តំបន់នៃការរីករាលដាល ILC

## ស្វែងយល់អំពីជំងឺមហារីកសុដន់ក្រពេញទឹកដោះ៖

- @LobularBCA
- អង្គការនៃជំងឺមហារីកសុដន់ក្រពេញទឹកដោះ
- អង្គការនៃជំងឺមហារីកសុដន់ក្រពេញទឹកដោះ
- អង្គការនៃជំងឺមហារីកសុដន់ក្រពេញទឹកដោះ

lobularbreastcancer.org

**Lobular Breast Cancer Alliance**