


# 침윤성 소엽 유방암 (ILC)으로 전이 부위 인지

ILC는 간, 폐 및 뼈와 같은 일반적인 부위뿐만 아니라, 위장관 및 난소와 같은 덜 일반적인 부위로도 전이될 (퍼질) 수 있습니다. ILC는 초기 치료 후 수년이 지나서 전이될 수 있습니다.

## 의사에게 보고할 증상 (보통의 아픔과 통증 이상)

- 특히 등, 엉덩이, 늑골 또는 넓적다리에서 사라지지 않는 원인불명의 뼈 통증
- 비정상적인 골반 출혈
- 복통, 식사 곤란 또는 복부 팽만 및/또는 팽창
- 원인 불명의 체중 감소
- 원인 불명의 숨가쁨, 호흡 곤란 또는 기침
- 잦은 두통, 어지러움, 지적 기능 장애
- 가슴, 겨드랑이, 목 또는 사타구니의 종창 또는 덩어리
- 피부색 변화, 지속적인 발진 또는 단단한 결절
- 새로운 시력 장애



ILC 전이 부위

## 소엽 유방암에 대해 알아보기:

@LobularBCA

Lobularbreastcanceralliance

소엽 유방암 연맹

소엽 유방암 연맹

lobularbreastcancer.org

