


# CÂNCER DE MAMA LOBULAR INVASIVO (CLI) CONHECER OS LOCAIS METASTÁTICOS

**O CLI pode sofrer metástase (disseminação) para locais comuns, como fígado, pulmões e ossos, bem como para locais menos comuns, como o trato gastrointestinal e os ovários. O CLI pode apresentar metástase muitos anos após o tratamento inicial.**

## SINTOMAS (ALÉM DAS DORES COMUNS) PARA RELATAR AO SEU MÉDICO

- Dor óssea inexplicável que não desaparece, especialmente nas costas, quadris, costelas ou coxas
- Sangramento pélvico incomum
- Dor abdominal, dificuldade para comer ou distensão abdominal e/ou inchaço
- Perda de peso inexplicável
- Falta de ar inexplicável, respiração dolorosa ou tosse
- Dores de cabeça frequentes, tontura, função intelectual prejudicada
- Inchaço ou caroços no peito, axila, pescoço ou virilha
- Mudança na cor da pele, erupção cutânea duradoura ou nódulo(s) firme(s)
- Nova dificuldade com sua visão



## PERGUNTAS SOBRE A PATOLOGIA DO CÂNCER DE MAMA LOBULAR

@LobularBCA

Lobularbreastcanceralliance

Lobular Breast Cancer Alliance

Lobular Breast Cancer Alliance

[lobularbreastcancer.org](http://lobularbreastcancer.org)

**LBCA**<sup>®</sup> Lobular Breast Cancer Alliance