


ДОЛЬКОВЫЙ РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (ILC) ЛОКАЛИЗАЦИЯ МЕТАСТАЗОВ

ILC способен метастазировать (распространяться) в часто затрагиваемые органы, например, в печень, легкие и кости, при этом его очаги имеют и менее типичную локализацию, например, в ЖКТ и яичниках. ILC может давать метастазы на протяжении многих лет после первичного лечения.

СИМПТОМЫ (ПОМИМО ОБЫЧНЫХ БОЛЕЙ), О КОТОРЫХ НУЖНО СООБЩИТЬ ВРАЧУ

- Необъяснимая боль в костях, которая не проходит, особенно в спине, тазобедренном суставе, ребрах или бедрах
- Необычное влагалищное кровотечение
- Боли в области живота, трудности при употреблении пищи или вздутие и (или) вспучивание живота
- Необъяснимая потеря веса
- Необъяснимая одышка, боль при дыхании или кашель
- Частые головные боли, головокружения, нарушение умственной деятельности
- Отечность или припухлости в груди, подмышечной впадине, на шее или в паху
- Изменение цвета кожи, продолжительная сыпь или твердые узелки
- Новые проблемы со зрением



ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛЬКОВОМ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

 @LobularBCA

 Lobularbreastcanceralliance

 Альянс по лечению долькового рака молочной железы (Lobular Breast Cancer Alliance)

 Альянс по лечению долькового рака молочной железы (Lobular Breast Cancer Alliance)

 lobularbreastcancer.org

 **LBCA**® Lobular Breast Cancer Alliance