


CÁNCER DE SENO LOBULILLAR INVASIVO (ILC) CONOZCA LOS SITIOS METASTÁSICOS

El ILC puede hacer metástasis (propagarse) a sitios comunes como el hígado, los pulmones y los huesos, así como a sitios menos comunes, como el tracto gastrointestinal y los ovarios. El ILC puede hacer metástasis muchos años después del tratamiento inicial.

SÍNTOMAS (MÁS ALLÁ DE LOS DOLORES Y LAS MOLESTIAS HABITUALES) QUE DEBE INFORMAR AL MÉDICO

- Dolor de hueso inexplicable que no desaparece, especialmente en la espalda, caderas, costillas o muslos
- Hemorragia pélvica inusual
- Dolor abdominal, dificultad para comer o distensión abdominal o hinchazón
- Pérdida de peso inexplicable
- Dificultad para respirar inexplicable, respiración dolorosa o tos
- Dolores de cabeza frecuentes, mareos, disminución de la función intelectual
- Hinchazón o bultos en el pecho, axila, cuello o ingle
- Cambio en el color de la piel, sarpullido duradero o nódulos firmes
- Nueva dificultad con la visión



Sitios de metástasis del ILC

INFÓRMESE SOBRE EL CÁNCER DE SENO LOBULILLAR:

 @LobularBCA

 Alianza contra el Cáncer de Seno Lobulillar

 Alianza contra el Cáncer de Seno Lobulillar

 Alianza contra el Cáncer de Seno Lobulillar

 lobularbreastcancer.org

 **LBCA**[®] | Lobular Breast Cancer Alliance