


INVASIVE LOBULAR BREAST CANCER (ILC) ALAMIN ANG MGA LUGAR NG PAGKALAT

Ang ILC ay puwedeng kumalat sa mga pangkaraniwang lugar gaya ng atay, baga at mga buto, gayundin sa hindi gaanong karaniwang lugar gaya ng GI tract at obaryo. Maaaring kumalat ang ILC maraming taon pa pagkatapos ng inisyal na paggamot.

MGA SINTOMAS (HIGIT PA SA KARANIWANG PANANAKIT) NA DAPAT I-REPORT SA IYONG DOKTOR

- Di-maipaliwanag na pananakit ng buto na hindi nawawala, partikular na sa likod, balakang, tadyang, o hita
- Di-pangkaraniwang pagdurugo ng pelvis
- Pananakit ng tiyan, hirap sa pagkain o paglobo ng bahaging tiyan at/o kabag
- Di-maipaliwanag na pagbaba ng timbang
- Di-maipaliwanag na kakapusan ng hininga, hirap sa paghinga, o ubo
- Madalas na pananakit ng ulo, pagkahilo, di-maayos na paggana ng isip
- Pamamaga o mga bukol sa dibdib, kilikili, leeg o singit
- Pagbabago ng kulay ng balat, nagtatagal na pamamantal o matigas na (mga) kulani
- Bagong panlalabo ng paningin



MATUTO PA TUNGKOL SA LOBULAR NA KANSER SA SUSO:

 @LobularBCA

 Lobularbreastcanceralliance

 Lobular Breast Cancer Alliance

 Lobular Breast Cancer Alliance

 lobularbreastcancer.org

 **LBCA**[®] | Lobular Breast Cancer Alliance