


UNG THƯ VÚ TIỂU THÙY XÂM LẤN (ILC) TÌM HIỂU VỀ VỊ TRÍ DI CĂN

ILC có thể di căn (lan rộng) đến các vị trí phổ biến như gan, phổi và xương cũng như các vị trí ít phổ biến hơn như đường tiêu hóa và buồng trứng. ILC có thể di căn trong nhiều năm sau khi điều trị ban đầu.

TRIỆU CHỨNG (NGOÀI ĐAU NHỨC THÔNG THƯỜNG) CẦN BÁO LẠI CHO BÁC SĨ

- Đau xương không rõ nguyên nhân và không thuyên giảm, đặc biệt là ở lưng, hông, xương sườn hoặc đùi
- Chảy máu vùng chậu bất thường
- Đau bụng, khó nuốt hoặc chướng bụng và/hoặc đầy hơi
- Giảm cân không rõ nguyên nhân
- Khó thở, đau nhói khi hít thở hoặc ho không rõ nguyên nhân
- Thường xuyên đau đầu, chóng mặt, suy giảm chức năng trí tuệ
- Sưng hoặc nổi bướu ở ngực, nách, cổ hoặc bẹn
- Thay đổi màu da, phát ban kéo dài hoặc (các) nốt bướu cứng
- Mới gặp khó khăn về thị lực




TÌM HIỂU VỀ UNG THƯ VÚ TIỂU THÙY XÂM LẤN:

 @LobularBCA

 Lobularbreastcanceralliance

 Lobular Breast Cancer Alliance

 Lobular Breast Cancer Alliance

 lobularbreastcancer.org

**LBCA**[®] | Lobular Breast Cancer Alliance