


علامات سرطان الثدي الفصيصي الغازي/السرطان الفصيصي الغازي (ILC)

يُعد سرطان الثدي الفصيصي ثاني أكثر الأنواع النسيجية شيوعاً لسرطان الثدي. قد يؤدي السرطان الفصيصي الغازي إلى تكوين كتلة، والتي يكون من الصعب اكتشافها من خلال الفحص الذاتي للثدي ويصعب رؤيتها عند إجراء التصوير الشعاعي للثدي.

أخبري مقدم الرعاية الصحية لديك بأي تغييرات تطرأ على ثدييك. إذا كنت تشعرين بهذه التغييرات ولكن نتيجة فحص التصوير الشعاعي للثدي كانت سلبية، فاطلبي من طبيبك إجراء اختبارات إضافية للتصوير بالأشعة.



تغييرات أخرى يجب الإبلاغ عنها: الشعور بحرارة أو احمرار، تقرحات أو تغييرات بالبشرة، خروج إفرازات من الحلمة وفي أغلب الحالات، لا تكون هذه التغييرات علامة على الإصابة بسرطان الثدي. قد لا تظهر أي علامات جسدية تدل على الإصابة بالسرطان الفصيصي الغازي (ILC).

تعرف على المزيد حول سرطان الثدي الفصيصي:



Lobular
Breast
Cancer
Alliance

<https://lobularbreastcancer.org>

LobularBCA@

Lobularbreastcanceralliance