

¿QUÉ ES LA DEFENSA AL PACIENTE?



Defensores del paciente: Las personas que buscan aprender sobre el cáncer de seno lobulillar para realizar lo siguiente:

Contribuir al avance de la investigación

Defensa de la investigación

Ayudar a educar a otros

Defensa educativa

¿Desea convertirse en un defensor del paciente?

Visite las páginas del sitio web de defensa de la LBCA.



[Defensa de la investigación](#)



[Defensa educativa](#)

Visite el sitio web de la LBCA para obtener más información, recursos y aprender sobre el voluntariado.

lobularbreastcancer.org

PUBLICACIONES ÚTILES

Haga clic en el enlace o escanee el código QR para leer el artículo.



[Carcinoma lobulillar del seno: Una revisión integral con perspectivas traslacionales.](#)



[Características clinicopatológicas y resultados en la comparación de pacientes con cáncer de seno ductal y lobular invasivo.](#)



[Carcinoma lobulillar invasivo del seno: La creciente importancia del subtipo especial.](#)

Visitar la biblioteca de publicaciones de la Alianza contra el Cáncer de Seno Lobulillar (LBCA)



lobularbreastcancer.org/ilc-publications-library

Este folleto se ha elaborado con la orientación del [Comité Científico Asesor de la LBCA](#) y con los aportes de los defensores de los pacientes.



INFORMACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE SENO LOBULILLAR



LBCA[®] | Lobular Breast Cancer Alliance

Visualizamos un mundo en el que el cáncer de seno lobulillar se detecta a tiempo, se trata de manera eficaz y se erradica de manera permanente.

¿QUÉ ES EL CÁNCER DE SENO LOBULILLAR?

También conocido como carcinoma lobulillar invasivo (ILC), es el segundo subtipo más frecuente de cáncer de seno después del carcinoma ductal invasivo (IDC).

Alrededor del 15 % de todos los cánceres de seno diagnosticados en los EE. UU. cada año son lobulillares.

- El ILC tiene, por lo general, receptores hormonales positivos (>90 % de los casos).
- Los tumores lobulillares presentan metástasis con mayor frecuencia en el hígado, los pulmones y los huesos, pero también pueden metastatizar en sitios poco frecuentes como el tracto gastrointestinal, los ovarios o el revestimiento del cerebro (leptomeninge).
- A pesar de que el pronóstico suele ser bueno, algunos estudios sugieren un mayor riesgo de recurrencia tardía (después de 5 años).
- Se necesita más investigación para comprender los factores que impulsan las recaídas y la resistencia al tratamiento.

DATOS DEMOGRÁFICOS DEL ILC*

* Fuente: SEER-22 DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER (NCI), 2016-2020.

Edad/sexo

La mayoría de los diagnósticos de ILC ocurren en mujeres mayores de 60 años.

Raza/origen étnico

El 73 % de los diagnósticos del ILC son de personas blancas no hispanas.

El 12 % son de personas hispanas.


El 9 % son de personas de color no hispanas.

El 5 % son de personas asiáticas no hispanas/originarios de una isla del Pacífico.



BAJO EL MICROSCOPIO

Células tumorales de ILC FRENTE A Células tumorales de IDC
Las células crecen en una sola fila. Las células se agrupan en «bultos».



DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES Y TRATAMIENTO

Diagnóstico por imágenes

Debido a que no suele formar bultos, el carcinoma lobulillar invasivo puede ser difícil de palpar y ver en el diagnóstico por imágenes.

- El ILC se detecta con frecuencia cuando el tumor mide ya 2 cm y afecta a los ganglios linfáticos axilares (en la axila).
- Aún no existen pautas específicas para una mejor detección inicial o el diagnóstico de tumores de ILC recurrentes.

Tratamiento

Se recomienda la terapia hormonal tanto para pacientes premenopáusicas como posmenopáusicas que presenten ILC con receptores hormonales positivos.

- Los inhibidores de la aromatasa y el tamoxifeno son los más utilizados.
- La quimioterapia puede ser beneficiosa para algunos pacientes con ILC, pero se está investigando en qué casos es más eficaz para aquellos con enfermedad en estadio temprano con receptores hormonales positivos.

Cada persona es diferente. Discuta las opciones de tratamientos y diagnóstico por imágenes con su equipo de atención.

¿QUÉ ES LA ALIANZA CONTRA EL CÁNCER DE SENO LOBULILLAR (LBCA)?

La **LBCA** es una organización nacional sin fines de lucro fundada y guiada por pacientes para abordar la falta de información e investigación del ILC.

- La LBCA está dirigida por un comité asesor de médicos e investigadores internacionales con experticia en ILC.
- La LBCA brinda información integral sobre el ILC a través de documentos y seminarios web.
- La LBCA ayuda a personas y científicos a trabajar juntos en la defensa y la investigación del ILC.

RECURSOS DE LA LBCA

La **LBCA** dispone de recursos para ayudarle a hablar con su equipo de atención sanitaria y mucho más.

- Preguntas para mi médico*
- Hoja informativa del ILC*
- Preguntas frecuentes*
- Información sobre el ILC metastásico*
- Historias del ILC
- Videos educativos
- Información sobre los ensayos clínicos en curso de ILC
- Apoyo a pacientes con cáncer de seno

* Disponible en 15 idiomas

Escanee aquí
para visitar la página de recursos de la LBCA.



lobularbreastcancer.org/resources